



Benzoyl peroxide + Erythromycin γέλη (5 + 3) % β/β

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.1 Ονομασία: ERYBENZ.
- 1.2 Σύνθεση: Δραστικά συστατικά: Benzoyl peroxide και Erythromycin. Έκδοxa: Hyprolose, Sodium hydroxide και/ή Citric acid, Methyl salicylate, Butylhydroxy anisole, Lemon fragrance oil, Ethanol, Water purified.
- 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Γέλη.
- 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: Benzoyl peroxide 5% β/β και Erythromycin 3% β/β.
- 1.5 Περιγραφή – Συσκευασία: Η γέλη benzoyl peroxide και η γέλη erythromycin συσκευάζονται σε σωληνάρια από συμπιεσμένο αλουμίνιο με εσωτερική επίστρωση ρητίνης εποιξυφαινολικού τύπου με βιδωτό πώμα από λευκό υψηλής πυκνότητας πολυαθυλένιο ή πολυπροπυλένιο. Το κάθε σωληνάριο περιέχει 12,5g ή 20g γέλης benzoyl peroxide 12,5g ή 20g γέλης erythromycin. Εξωτερικά είναι τυπωμένα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά της παρτίδας. Κάθε κουτί περιέχει δυο σωληνάρια, ένα άδειο πλαστικό βάζο για την ανάμειξη των προϊόντων πριν από τη χρήση, μια πλαστική σπάτουλα και μια οδηγία χρήσης.
- 1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Για την τοπική θεραπεία της κοινής ακμής.
- 1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK) LTD.
- 1.8 Παρασκευαστής: HELP ABEE.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο που σας χορήγησε ο γιατρός. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να σας εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- 2.1 Γενικές πληροφορίες: Η γέλη παρέχει έναν αντιμικροβιακό παράγοντα με ήπιες κερατολυτικές ιδιότητες και επιπλέον αντιβιοτικά αποτελέσματα και αντισμηματορροϊκές ιδιότητες.

Η erythromycin εμποδίζει την παραγωγή της λιπάστησης ενώ το benzoyl peroxide μειώνει το σύνολο των φαγέσωρων και έχει αντιβακτηριδιακή δράση.

- 2.2 Ενδείξεις: Το προϊόν ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία της κοινής ακμής.

- 2.3 Αντενδείξεις: Το προϊόν αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαίσθηση στο benzoyl peroxide, στην erythromycin ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοxa.

- 2.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση: Το προϊόν ενδείκνυται μόνο για τοπική εξωτερική χρήση.

Κρατήστε το φάρμακο μακριά από τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και άλλους βλεννογόνους.

Τα πολύ ξανθά άτομα και οι ασθενείς με αποφλοιωμένο δέρμα θα πρέπει να αρχίσουν τη θεραπεία με μία μόνο εφαρμογή την πημέρα, δηλ. πριν από την υγρασίανή κατάκλιση, επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Το προϊόν μπορεί να αποχρωματίσει τα μαλλιά ή τα βαμμένα υφάσματα.

Η χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να σχετίζεται με ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών, περιλαμβανομένων των μυκήτων. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, να διακοπεί η χρήση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Χορήγηση κατά την κύπη και τη γαλουχία: Η ασφαλής χορήγηση της γέλης κατά τη διάρκεια της κύπης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Επομένως το erybenz, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν θεωρείται απολύτως απαραίτητο από το γιατρό.

Επιδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Καμία επίδραση δεν είναι γνωστή.

- 2.5 Άλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η σύγχρονη τοπική θεραπεία της ακμής (με άλλα φάρμακα) πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αθροιστικού ερεθισμού. Έχει επαρκώς καταδειχθεί η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ κλινταμακίνης και ερυθρομυκίνης.

- 2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η γέλη εφαρμόζεται 2 φορές ημεροπίσιως, πρωί και βράδυ, στις προσβεβλημένες από την ακμή περιοχές ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Οι πάσχουσες περιοχές πρέπει αρχικά να πλένονται απαλά, να ξεπλένονται με χλιαρό νερό και να στεγνώνονται καλά με πολύ ελαφρές κινήσεις. Η γέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα σε μια λεπτή στρώση και να επαλείφεται με ελαφρά εντριβή με τις άκρες των δακτύλων μέχρι να απορροφηθεί. Οι ασθενείς θα πρέπει να πλένουν καλά τα χέρια τους μετά την εφαρμογή της γέλης.

Δεν συνιστάται η χρήση της γέλης σε παιδιά.

Οδηγίες χρήστος: Πριν από τη χρήση αναμείχτε το περιεχόμενο των δυο σωληναρίων στο ειδικό βαζάκι που περιέχεται στο κουτί. Αναμείχτε χροσιμοποιώντας την ειδική σπάτουλα για να δημιουργήσετε μια ομοιογενή γέλη. Μετά την ανάμειξη το προϊόν είναι έτοιμο για εφαρμογή.

Προσοχή: Μην χροσιμοποιείτε το περιεχόμενο του κάθε σωληναρίου ξεχωριστά στο δέρμα. Μετά την ανάμειξη, διατηρείστε το προϊόν στο ψυγείο για 2 μήνες.

2.7 Υπερδοσολογία – Αντιμετώπιση: Εξαιτίας της τοπικής εφαρμογής του φαρμάκου δεν παρατηρείται πρόβλημα υπερδοσολογίας.

Τηλέφωνο Κέντρου διληπτηρίσεων: 210-7793777.

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε μία δόση: Εάν παραλείψατε μία δόση, εφαρμόστε τη γέλη στην πάσχουσα περιοχή μόλις το θυμοθείτε, εκτός εάν είναι η ώρα της επόμενης δόσης, οπότε δεν πρέπει να διπλασιάσετε τη δόση, αλλά να συνεχίσετε όπως προηγουμένως.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι ηρούτητα του δέρματος και κνίδωση, οίδημα προσώπου, ερύθημα, δερματίτιδα εξ' επαφής, φωτευσαισθησία, απολέπιση, λιπαρότητα.

2.10 Ημερομνία λήξης του προϊόντος: Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομνία αυτή έχει παρέλθει μνη το χροσιμοποιείτε. Το προϊόν μετά την ανάμειξη διατηρείται 2 μήνες στο ψυγείο.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Πριν την ανάμειξη των δυο σωληναρίων διατηρείστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ($\leq 25^{\circ}\text{C}$).

Μετά την ανάμειξη των δυο σωληναρίων, διατηρείστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 2-8 $^{\circ}\text{C}$ (ψυγείο) για 2 μήνες. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

2.12 Ημερομνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου: 08/2012.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χροσιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πιληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πιληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πιληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουστρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

verisfield®

Verisfield (UK) Ltd, 41 Chalton str., NW1 1JD, London UK.

Υποκατόστημα Ελλάδος: Βύρων 8, 152 31 Χαλάνδρι

T 210 7475196 | F 210 7475197 | E info@verisfield.gr | www.verisfield.gr